





# Conducción













# Raleo

- Favorece calibre
- Homogeniza cosecha
- Con tijeras con frutos de 2 cm
- Repasar a los 20 días eliminando nuevos frutos
- Criterio:
  - Dejar un fruto por nudo
  - Dejar 20 cm entre frutos
- Alternativa: Etephon 500 ppm en flor



U de Chile  
FONDEF D961062







R 2



R 2



R 4



# Polinización





# Otras prácticas culturales





# Plagas y enfermedades





# Frutos en pre-cosecha



- **Golpe de sol.**
- **Partidura de frutos.**
- **Fructificación terminal:**
  - **Frutos en el suelo.**
- **Presencia de espinas:**
  - **Cosecha.**
  - **Daño por 'ramaleo'**



# Cosecha











# Cosecha

- Época:
  - Fines de marzo hasta mayo
  - Entrada en producción a 3 o 4 años
  - Índice de cosecha: 1,8 acidez titulable, 12<sup>o</sup> brix, crujido...
- Método:
  - 2 a 3 pasadas
  - Con tijera
  - Con guantes
- Productividad:
  - 15 – 30 t/ha al 9<sup>o</sup> año







# Postcosecha

- 85 a 95% HR
- 5-7 °C
- 6 meses



Gracias por su atención